

Recuerde, el implante **no le protege contra las Infecciones de Transmisión Sexual o el VIH.**

Si busca protección contra las infecciones de transmisión sexual y VIH, los condones internos y externos son excelentes opciones.



## ¿CÓMO FUNCIONA EL IMPLANTE?

- El implante es un tubito de plástico delgado, del tamaño de un fósforo. Un proveedor de salud lo coloca debajo de la piel en la parte superior del brazo.
- El implante libera progestina, una hormona como las que produce su cuerpo. Mientras el implante está en su brazo, la hormona impide que sus ovarios liberen óvulos. Sin un óvulo, no puede quedar embarazada.
- Cada implante dura hasta 5 años.
- Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Menos de 1 de cada 100 personas usando el implante por un año queda embarazada.

## ¿CÓMO DEBO USAR EL IMPLANTE?

- Después de adormecer su piel, un proveedor de salud coloca el implante debajo de la piel en la parte superior del brazo. Esto toma solo unos minutos. Se puede hacer en el consultorio o la clínica.
- No debe mojar su brazo por 24 horas de que se le haya colocado el implante.
- Su proveedor de salud puede quitarle el implante cuando quiera.

## ¿CUÁNDO EMPIEZA A FUNCIONAR EL IMPLANTE?

- El implante empieza a funcionar 7 días después de que está colocado. **Use un método anticonceptivo de respaldo por 7 días.**

## ¿POR CUÁNTO TIEMPO FUNCIONA EL IMPLANTE?

- El implante está aprobado por la FDA para 3 años y puede funcionar hasta 5 años. Si quiere seguir usándolo, puede conseguir un implante nuevo después de 3-5 años.
- Si no le gusta el implante o si decide quedar embarazada, su proveedor de salud puede quitar el implante en cualquier momento.

## ¿QUÉ LE GUSTA A LA GENTE DEL IMPLANTE?

- Es muy seguro y eficaz.
- No contiene estrógeno.
- No necesita un examen pélvico para colocarlo.
- Es una buena opción si quiere prevenir el embarazo por mucho tiempo.
- Puede ir a la clínica para quitar el implante un cualquier momento.
- El implante es seguro usar mientras está amamantando.
- No necesitar pensar en anticonceptivos antes o durante el sexo.

## ¿CÓMO ME AFECTARÁ EL IMPLANTE?

- El implante causa las menstruaciones a cambiar. La mayoría de personas tienen manchados irregulares (frecuente y difícil adivinar). Puede sangrar más, menos, o no sangrar. Esto es normal.
- Los cambios en la menstruación duran hasta que le quite el implante.
- Puede mejorar los calambres.
- Puede tener: cambios de estado de ánimo, aumento de peso, dolor de cabeza, acné, y/o cambios en la piel del brazo.
- La mayoría de efectos secundarios desaparecen cuando se le quite el implante.
- Después de quitar el implante, puede quedar embarazada inmediatamente.

## ¿LA GENTE PUEDE VER EL IMPLANTE EN MI BRAZO?

- La mayoría de implantes no se pueden ver, pero usted lo puede sentir si toca la piel que lo cubre.

continuado en el otro lado →

Recuerde, el implante **no le protege contra las Infecciones de Transmisión Sexual o el VIH.**

Si busca protección contra las infecciones de transmisión sexual y VIH, los condones internos y externos son excelentes opciones.



### ¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR EL IMPLANTE?

- En una cita con un proveedor de salud.

### ¿EL IMPLANTE ESTÁ SEGURO?

- El implante es muy seguro. Problemas serios son raros. Si tiene cualquiera de los síntomas abajo, llame a su proveedor de salud:
  - Enrojecimiento, calor, o supuración en su brazo
  - Fiebre (más de 101°F)
- Si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas **en cualquier momento** mientras tenga el implante, llame a su proveedor de salud:
  - Sensación de embarazo (dolor en los pechos, náusea)
  - Una prueba casera de embarazo positiva

